



المجلس العربي للطفولة والتنمية  
Arab Council for Childhood and Development



# تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال آل سعود

وبمناسبة اليوم العالمي للطفل  
المؤتمر الافتراضي

**"جائحة كورونا وحقوق الطفل: من أزمة إلى فرصة"**

16 نوفمبر / تشرين الثاني 2020

التوقيت



8.00



10.00



11.00




# الآثار الصحية المباشرة وغير المباشرة لجائحة كوفيد-19 على الأطفال

الدكتور خالد صديق  
صحة الأطفال والمراهقين، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق  
المتوسط

المؤتمر الافتراضي للمجلس العربي للطفولة والتنمية حول حقوق الطفل وجائحة كورونا: من  
ازمة إلى فرصة

16 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

منظمة  
الصحة العالمية  
المكتب الإقليمي لشرق المتوسط



# الوضع قبل كوفيد-19

معدلات وفيات في جميع الفئات العمرية

ارتفاع

115  
وفاة/100000  
مولود حيّ



10 - 19 سنة

109 وفيات/  
100000  
مولود حيّ



5-9 سنوات

47 وفاة/1000  
مولود حيّ



أقل من 5 سنوات


26 وفاة/1000  
مولود حيّ  
الولادات



حديثو الولادة

# معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة في البلدان العربية بإقليم شرق المتوسط لعام 2019


(الوفيات/1000 مولود حيّ)



المصدر: تقرير الفريق المشترك بين الوكالات المعني بتقدير وفيات الأطفال، 2020

# حالات الطوارئ المُصنَّفة في البلدان العربية

Weekly signals and events				Total number of graded emergencies			
68	2	0	14	3 Grade 3	8 Grade 2	2 Grade 1	14
Signals detected	Signal followed-up	New event	Ongoing events	0 Protracted 3	1 Protracted 2	0 Protracted 1	Total number of graded emergencies



# ما نعرفه عن الأطفال خلال جائحة كوفيد-19

## • الإبلاغ عن كوفيد-19 أقل بكثير لدى الأطفال منه لدى البالغين

- ▶ يمثل الأطفال والمراهقون حوالي 8% من الحالات المبلغ عنها (و 29% من سكان العالم)
- ▶ العدوى الخفيفة وغير المصحوبة بأعراض أكثر شيوعًا، وقد لا يُبلغ عنها بالقدر الكافي

## • الأطفال يعانون من مرض أخف بكثير من البالغين

- ▶ لكن الأطفال الذين يعانون من حالات مرضية كامنة أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض خطيرة
- ▶ نادرًا ما يصاب بعضهم بمرض وخيم مثل المتلازمة الالتهابية متعددة الأجهزة
- ▶ المتلازمة الالتهابية متعددة الأجهزة هي التهاب نادر مع حمى مستمرة
- وتحدث بعد 2-4 أسابيع من بدء الإصابة بكوفيد-19، وتشفى غالبًا بالعلاج، ونادرًا ما تحدث الوفاة


## • دور الأطفال في انتقال العدوى غير مفهوم بالكامل حتى الآن

- ▶ يمكن أن يصاب الأطفال من جميع الأعمار وينقلون الفيروس إلى الآخرين
- ▶ تشير الدراسات التي أجريت حتى الآن إلى انخفاض الانتشار بين الأطفال دون سن العاشرة مقارنة بالأكبر عمرًا
- ▶ العدوى تصيب المراهقين أكثر من الأطفال الصغار
- ▶ يبدو أن الأطفال الأكبر عمرًا أكثر عرضة للإصابة بالعدوى وينقلون العدوى أكثر من الأطفال الأصغر عمرًا

# مثال: توزيع حالات كوفيد-19 حسب العمر والجنس بين الأطفال التي أبلغ عنها في نموذج تقرير الحالات في مصر

14 شباط/فبراير - 14 أيلول/سبتمبر 2020 (العدد = 99893)

الإجمالي		ذكور		إناث		الفئة العمرية
%	العدد	%	العدد	%	العدد	
0.4%	405	0.2%	212	0.2%	193	0 إلى 04
0.6%	551	0.3%	290	0.3%	261	05 إلى 09
0.7%	702	0.3%	319	0.4%	383	10 إلى 14
1.5%	1533	0.7%	692	0.8%	841	15 إلى 19
4.2%	4225	1.8%	1771	2.5%	2454	20 إلى 24
7.0%	7024	3.3%	3297	3.7%	3727	25 إلى 29
9.2%	9173	4.7%	4688	4.5%	4485	30 إلى 34
10.2%	10152	5.5%	5509	4.6%	4643	35 إلى 39
9.6%	9573	5.4%	5359	4.2%	4214	40 إلى 44
8.8%	8768	4.9%	4906	3.9%	3862	45 إلى 49
9.1%	9107	4.9%	4868	4.2%	4239	50 إلى 54
10.2%	10186	5.3%	5299	4.9%	4887	55 إلى 59
9.0%	8945	4.5%	4488	4.5%	4457	60 إلى 64
8.1%	8044	4.0%	3989	4.1%	4055	65 إلى 69
5.8%	5804	2.9%	2877	2.9%	2927	70 إلى 74
3.2%	3204	1.6%	1631	1.6%	1573	75 إلى 79
1.7%	1687	0.9%	858	0.8%	829	80 إلى 84
0.8%	810	0.4%	383	0.4%	427	85 وأكثر
100%	99893	51.5%	51436	48.5%	48457	الإجمالي



مصدر البيانات: قاعدة بيانات أنفلونزا شرق المتوسط

10/09/2020




## ومع ذلك، يمكن أن يكون الأطفال من بين أشد الضحايا تضرراً بجائحة كوفيد-19.

الزيادة في النسبة المئوية لوفيات الأطفال دون سن الخمس سنوات بسبب "كوفيد-19" بالمقارنة مع خط الأساس	إجمالي عدد الوفيات الإضافية	بسبب زيادة الهزال	بسبب انخفاض التغطية الصحية	وفيات إضافية بين الأطفال تحت سن الخمس سنوات	تقدير عدد الوفيات الإضافية بين الأطفال دون سن الخمس سنوات على مدى ستة أشهر وفق سيناريو تأثير "كوفيد-19"
8%	11,106	2,034	9,072	سيناريو 1	
10%	19,604	4,228	15,376	سيناريو 2	
39%	51,409	11,697	39,712	سيناريو 3	

الأثر المحتمل لتعطّل الرعاية الصحية بسبب كوفيد-19 على وفيات الأطفال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا WHO/UNICEF  
<https://www.unicef.org/mena/reports/potential-impact-health-care-disruption-child-mortality-mena-due-covid-19>



# تعطل الخدمات الصحية للأطفال





## الآثار الصحية غير المباشرة

### • الصحة البدنية

- مشاكل في التغذية
- قلة النشاط البدني
- العنف
- تعطل التحصينات
- تشويه الأعضاء التناسلية للإناث
- حمل المراهقات – وزواج الأطفال

### • مشاكل في الصحة النفسية

- الأطفال
- مقدمو الرعاية (الوالدان وأفراد الأسرة)



## التأثيرات غير المباشرة: لإغلاق المدارس

- يعيق الإغلاق الخدمات المدرسية مثل التمنيع والوجبات المدرسية والصحة النفسية والدعم النفسي، ويمكن أن يسبب قلقًا بسبب فقدان التفاعل مع الأقران واختلال الروتين
- عدم الالتحاق بالمدارس يزيد خطر الاستغلال الجنسي وزواج الأطفال والعنف والتهديدات الأخرى
- تتفاقم الأضرار على أطفال المهاجرين واللاجئين والأقليات والأطفال الذين لديهم إعاقات والأطفال في المؤسسات أو في البلدان المتأثرة بالنزاعات



# الفرص المتاحة:

- تحسّنت المعرفة بالجائحة تحسناً كبيراً.
- أصبح متاحاً إرشادات متعدّدة فيما يخص المعالجة والوقاية.
- زيادة الاستعداد والرغبة في إعادة فتح المدارس.
- تحسّن وانتشار الممارسات الصحية والنظافة الجيدة.
- التضامن والشراكة والتنسيق غير المسبوق بين جميع أصحاب المصلحة.



لا يوجد دليل أن #COVID19 ينتقل بالهواء. بل ينتشر عن طريق القطرات والمخالطة ويمكن منعه بنظافة اليد والجهاز التنفسي والمباعدة الاجتماعية. على مقدمي الرعاية الصحية اتباع احتياطات العدوى المنقولة بالهواء أثناء إجراءات توليد الهباء الجوي أي حين يمكن للفيروس البقاء فترة أطول في الهواء

Translate Tweet



**FREQUENTLY ASKED QUESTIONS:**  
Breastfeeding and COVID-19  
For health care workers  
(12 May 2020)



المتلازمة الالتهابية المتعددة الأجهزة لدى الأطفال والمرافقين في سياق مرض كوفيد-19

موجز علمي

15 أيار/مايو 2020



منظمة  
الصحة العالمية





شكراً لكم

